ÖKON (2017): Aktualisierte Fotodokumentation zur Molluskensiebung nach Deichner et al. (2003)

Teil 1: Fotodokumentation der Molluskenprobenahme und Aufbereitung mittels Schlamm-Sieb-Rüttelmaschine

Teil 2: Vorteile der Verwendung einer Schlamm-Sieb-Rüttelmaschine

ÖKON GmbH
 Raffastraße 40 – OT Roding
 93142 Maxhütte-Haidhof
 Telefon: +49 9471 3077479
 Homepage: www.oekon.com
 Email: oekon@oekon.com

(aus Hildebrandt et al. 2005)

Teil 1:

Molluskenprobenahme und Aufbereitung mittels Schlamm-Sieb-Rüttelmaschine

Foto 1: Zur Erfassung von Landmollusken werden 0,25 m² Bodensubstrat mit Hilfe eines Spatens entnommen (a) und zum Transport sowie zur weiteren Aufbewahrung in spezielle Beutel abgefüllt (b, c). Zusätzlich werden geeignete Biotopstrukturen gezielt nach Mollusken abgesehen (d).

Foto 2: Die Erfassung von Wassermollusken erfolgt i. d. R. mit einem langstieligen Kescher. Das gesammelte Material wird bis zur weiteren Verarbeitung ebenfalls in spezielle Beutel verpackt (siehe Foto 1).

Foto 3: Mollusken-Substrat-Proben werden idealerweise mit einer Schlamm-Sieb-Rüttelmaschine (konstruiert von Klaus Groh, Bad Dürkheim) gleichzeitig geschlämmt (gewaschen), dabei gerüttelt und gesiebt.

Foto 4: Die drei Siebe der Schlamm-Sieb-Rüttelmaschine – Maschenweiten von links nach rechts: 0,7 mm, 2,0 mm und 4,0 mm.

Foto 5: Vor Beginn der Molluskensiebung werden eine entsprechende Anzahl als Dreiergruppen gekennzeichnete Trägersiebe mit Drahtboden zum Trocknen der Fraktionen bereitgestellt.

Foto 6: Der Drahtboden der einzelnen Trägersiebe wurde vorher mit sauberem Papier ausgekleidet.

Foto 7: Falls nötig werden die Proben vor dem Siebvorgang im sauberen Eimer eingeweicht.

Foto 8: Der Eimer mit der Probe wird restlos auf das oberste grobe Sieb entleert und sauber gespült.

Foto 9: Das Substrat mit den enthaltenen Mollusken wird mit Wasser nass ausgeschlemmt, gleichzeitig gerüttelt und auf 3 Fraktionen unterschiedlicher Maschenweite verteilt gesiebt (siehe Foto 4). Nach jeweils ca. 10 Proben (je nach Menge) wird der Behälter der Siebrüttelmaschine mit der ausgeschlemmten Erde entsorgt und der Behälter wieder mit frischem Wasser befüllt.

Foto 10: Die 3 geschlemmten und durch Siebe gerüttelten Fraktionen der Probe werden auf die vorbereiteten Trägersiebe aufgebracht.

Foto 11: Die nassen Fraktionen (3 pro Probe) werden vor Regen geschützt getrocknet.

Foto 12: Die getrockneten Fraktionen (3 pro Probe) werden sorgfältig verpackt und gekennzeichnet.

Foto 13: Die Auslese der Molluskenfraktionen (3 pro Probe) erfolgt mit Hilfe eines Binokulars oder einer Lupe im Labor.

Foto 14: Da je nach Auftrag alle Individuen einer Probe ausgelesen werden müssen, kann dies mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Foto 15: Die Molluskenprobe ist fertig zur Bestimmung. Dabei werden alle Individuen, auch Gehäuse- und Schalenreste, soweit möglich, bis zur Art bestimmt.

Foto 16: Beispiel einer multivarianten Auswertung von Molluskendaten aus dem Donauvorland im Isarmündungsgebiet mit Bioindikator-Molluskenarten für Fluss- und Auenhabitate und den diese prägenden Standortfaktoren (aus Rumm et al. 2014a).

Teil 2:

Vorteile des Einsatzes einer Schlamm-Sieb-Rüttelmaschine zur Aufbereitung von Mollusken-Bodenproben (vgl. Deichner et al. 2003):

- Deutlich höhere Ausbeute an Arten und Individuen als bei einer Aufarbeitung mit alleiniger Trockensiebung (siehe Abbildung 1);
- Gleichzeitiges "Waschen" der Schalen und Gehäuse, was die anschließenden Auslese- und Bestimmungsarbeiten deutlich erleichtert;
- Staubfreier Siebvorgang verringert gesundheitliche Belastung des Bearbeiters.

Die Boden-Probenahme und die Aufarbeitung des Probenmaterials mittels Schlamm-Sieb-Rüttelmaschine hat sich in zahlreichen Projekten bewährt (u.a. Foeckler et al. 2006, 2009a, Rumm et al. 2016) und gewährleistet - verglichen mit "klassischen" Handaufsammlungen - eine hohe, bearbeiterunabhängige Erfassung der Molluskenfauna (vgl. Deichner et al. 2003).

Abbildung 1: Prozentuale Zusatzausbeute an Arten (a) und Individuen (b) durch die Schlamm-Siebung (verändert nach Deichner et al. 2003).

Literaturverzeichnis und Publikationsliste ÖKON zum Thema Mollusken (Auswahl):

- Deichner, O., Foeckler, F., Groh, K. & Henle, K. (2003): Anwendung und Überprüfung einer Rüttelmaschine zur Schlammung und Siebung von Mollusken-Bodenproben. – Mitt. der Dtsch. Malakozoologischen Ges., 69/70: 71-77.
- Foeckler, F., Schmidt, H. & Herrmann, T. (2010): Ökologische Untersuchungen im Isarmündungsgebiet. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): BfN-Skript 276, Bonn. Downloads:
- Skript: http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_276a.pdf ohne Anhang
- Anhang: http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_276b.pdf.
- Foeckler, F., Deichner, O., Schmidt, H. & Castella, E. (2009a): Kapitel 6.2: Weichtiergemeinschaften als Indikatoren für Wiesen- und Rinnenstandorte der Elbauen. In: Scholz, M., Dziock, F., Henle, K., Stab, S. & Foeckler, F. (Hrsg.): Entwicklung von Indikationssystemen am Beispiel der Elbaue: 203–243.
- Foeckler, F., Deichner, O., Ilg, C., Schmidt, H., Scholz, M. & Henle, K. (2009b): Mollusken im Auengrünland des Biosphärenreservates Mittelelbe vor und nach dem extremen Sommerhochwasser 2002. In: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. 30 Jahre Biosphärenreservat Mittelelbe. Forschung und Management im Biosphärenreservat Mittelelbe. 46. Jg., Sonderheft 2009/1: 76-85.
- Foeckler, F., Deichner, O., Schmidt, H. & Castella, E. (2006): Suitability of Molluscs as Bioindicators for Meadow and Flood-Channels of the Elbe-Floodplains. In: Dziock, F., Foeckler, F., Scholz, M., Stab, S. & Henle, K. (Hrsg.): Bioindication and Functional Response in Flood Plains Systems - Based on the Results of the Project RIVA. Special issue, International Review of Hydrobiology, 91/4: 314-325.
- Foeckler, F., Deichner, O., Schmidt, H. & Follner, K. (2000a): Weichtiergemeinschaften als Indikatoren für Wiesen- und Rinnen-Standorte der Elbauen. In: Friese, K., Witter, B., Miehlich, G. & Rode, M. (Hrsg.): Stoffhaushalt von Auenökosystemen – Böden und Hydrologie, Schadstoffe, Bewertungen“: 391-402.
- Foeckler, F., Deichner, O., Schmidt, H. & Jacob, K. (2000b): Weichtiergemeinschaften als Indikatoren für Auenstandorte – Beispiele von Isar und Donau. Angewandte Landschaftsplanung, Heft 37: 33–47.
- Foeckler, F., Diepolder, U. & Deichner, O. (1991): Water mollusc communities and bioindication of lower Salzach flood plain waters. Regulated Rivers: Research & Management, Vol. 6/4: 301-312.
- Foeckler, F. (1991): Classifying and Evaluating Alluvial Flood Plain Waters of the Danube by Water Mollusc Associations. Verh. Internat. Verein. Limnol. 24: 1881-1887.
- Foeckler, F. (1990): Charakterisierung und Bewertung von Augewässern des Donaumaas Straubing durch Wassermolluskengesellschaften. Beiheft 7 zu den Berichten der ANL, Laufen/Salzach, 154 S..
- Hildebrandt, J., Leyer, I., Dziock, F., Fischer, P., Stab, S., Foeckler, F. & Henle, K. (2005) Auengrünland. In Scholz, M., Stab, S., Dziock, F. & Henle, K.: Lebensräume der Elbe und ihre Auen. - Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft“: 234-264.
- Ilg, C., Foeckler, F., Deichner, O. & Henle, K. (2011): Hydrological gradient and species traits explain gastropod diversity in floodplain grasslands. River Research and Applications, DOI: 10.1002/rra.1552.
- Ilg, C., Foeckler, F., Deichner, O. & Henle, K. (2009): Extreme flood events favour floodplain mollusc diversity. Hydrobiologia 621: 63 - 73.
- Ilg, C., Deichner, O., Foeckler, F., Schmidt, H., Henle, K. & Scholz, M. (2009): Molluskengesellschaften im Deichrückverlegungsgebiet Roßlauer Oberluch im Biosphärenreservat Mittelelbe. In: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. 30 Jahre Biosphärenreservat Mittelelbe. Forschung und Management im Biosphärenreservat Mittelelbe. 46. Jg., Sonderheft 2009/1: 130-134.
- Ilg, C., Dziock, F., Foeckler, F., Follner, K., Gerisch, M., Glaeser, J., Rink, A., Schanowski, A., Scholz, M., Deichner, O. & Henle, K. (2008): Long-term Reactions of Plants and Macroinvertebrates to Extreme Floods in Floodplain Grasslands. Ecology 89/9: 2392-2398.
- Janus, H. (1968): Unsere Schnecken und Muscheln. Kosmos-Naturführer, Stuttgart.
- Rumm, A., Foeckler, F., Deichner, O., Scholz, M. & Gerisch, M. (2016): Dyke-slotting initiated rapid recovery of habitat specialists in floodplain mollusc assemblages of the Elbe River, Germany. Hydrobiologia, 771/1: 151-163.
- Rumm, A., Foeckler, F., Scholz, M. & Gerisch, M. (2015): Deichöffnung im Roßlauer Oberluch (Mittelelbe, Sachsen-Anhalt) – Auswirkungen auf die Diversität und Artenzusammensetzung der Molluskenfauna. In: Feit, U. & H. Korn (Hrsg.): Treffpunkt Biologische Vielfalt XIV, BfN-Skripten 397: 65-71.
- Rumm, A., Röder, U., Wiesner, A., Deichner, O., Schmidt, H., Adler, M., Berger, C. & Foeckler, F. (2014a): Monitoring von Land- und Wassermollusken im Zuge der Maßnahmen des Vorlandmanagements Donau, Umsetzungsabschnitt III – Isarmündung bis Staatshaufen. Auenmagazin, Heft 7: 43-48.
- Rumm, A., Scholz, M., Bushart & Foeckler, F. (2014b): Mollusken als Bioindikatoren in Auenlebensräumen am Beispiel der Elbe und der Donau. Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal 2014: 28-34.